רפלקס האישון לבן בילדים - אישון לבן בדיקת רפלקס בעיות בעיניים בקרב ילדים.

ניתן לזהות מגוון נרחב של בעיות בעיניים בקרב ילדים. באמצעות בדיקה ביתית, ראשונית ופשוטה

מאת: **ד"ר שחר פרנקל** השירות המומחה האבא לגידול עניים, מחלקת עניים,
המרכז הרפואי "שבא", רמת-גן, המרכז הרפואי "שבא", רמת-גן

ד"ר שחר פרנקל

רקע

בבדיקת רפלקס האישון בילדים בטיפול ראשוני אין אבחון מדויק אלא חוסר יכולת לזהות מגוון נרחב של בעיות בעיניים בקרב ילדים. בדיקת רפלקס האישון - אישון לבן - מבטיחה לילדים בבדיקה מדויקת מה שמאפשר אבחון מוקדם ומניעת נזקים בעיניים. בדיקה זו אינה מצריכה ציוד מיוחד ומבוצעת בקלות בכל בית חולים, מרפאה ובמרפאות בקהילה. בדיקה זו מומלצת לכל ילד בגיל שלוש. ראוי לאתר ילדים אלו בגיל מוקדם ולהפנותם לבדיקה מומחית.

אין בודקים?

לא פורסם.

תמונה 1: מראה החדר מבאישון.

תמונה 2: כמות הפרילה מידת הפיילה.

טלפון: 03-9650101
כבוד אליעזר בן-יוסף חוסם שירלי וזהבה קוסמטיקה
לראשון לציון רח' שמשון פרס 3 (פרס בנק)

שירלי וזהבה מכון בוטיק לקוסמטיקה רפואית

:שלבי בדיקת הרפלקס האדום

1. בדיקת רפלקס האדום - הבדיקה מתבצעת בחדר חשוך. הילד יושב מול הבוחן, ומביט לכיוון אור אופטלמוסקופ. הבוחן מכוון אור אל עיני הילד ומתבונן בהבזק אדום בעין. הבזק אדום תקין מעיד על שקיפות הקרנית, הנוזל בחלל הקדמי, העדשה והרטינה. אי-נוכחות הבזק אדום מעידה על בעיה בעין.
2. בדיקת אישון לבן - הבוחן מסתכל בעיני הילד ומחפש אחר אזורים לבנים. אישון לבן מעיד על בעיה בעין, כגון קטרקט, גידול, נוזל בחלל הקדמי, או בעיה ברשתית.
3. בדיקת אישון - הבוחן מסתכל בעיני הילד ומחפש אחר אי-סימטריה בגודל האישון, בצורה, בתגובה לאור ובמיקום. אי-סימטריה מעידה על בעיה בעין.

:מתי לפנות לרופא?

- אם הבוחן מבחין בבעיה בעין, יש לפנות לרופא עיניים לבדיקה מקיפה. אבחון מוקדם ומניעת נזקים בעיניים הם חשובים מאוד.
- אם הילד מראה סימנים לבעיה בראייה, כגון חוסר תגובה לאור, חוסר יכולת לעקוב אחר אובייקטים, או חוסר יכולת לזהות פנים, יש לפנות לרופא עיניים.
- אם הילד נולד עם בעיות בעיניים, כגון קטרקט מולד, גלאוקומה מולדת, או מום בעין, יש לפנות לרופא עיניים.

:מסקנות

בדיקת רפלקס האישון לבן בילדים בטיפול ראשוני מאפשרת אבחון מוקדם ומניעת נזקים בעיניים. בדיקה זו אינה מצריכה ציוד מיוחד ומבוצעת בקלות בכל בית חולים, מרפאה ובמרפאות בקהילה. בדיקה זו מומלצת לכל ילד בגיל שלוש. ראוי לאתר ילדים אלו בגיל מוקדם ולהפנותם לבדיקה מומחית.